

Cliniderm® Lösung



WILD

Zusammensetzung

1 g Lösung enthält:

Wirkstoff: 5 mg Triclosan.

Hilfsstoffe: Aromastoffe (Kamillenöl, Thymianöl), Detergentien sowie weitere Hilfsstoffe.

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Reinigung empfindlicher und fettiger Haut bei Akne (Pickel, Mitesser, Pusteln).

Dosierung/Anwendung

Jugendliche und Erwachsene: 1–2 mal täglich anwenden.

Cliniderm Lösung auf nassen Waschlappen, Schwamm oder die Handinnenseite geben und die zu waschenden Stellen gut reinigen. Danach mit klarem Wasser reichlich spülen.

Kontraindikationen

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nicht bei Kindern unter 12 Jahren anwenden.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

Kontakt mit Augen und Schleimhäuten ist zu vermeiden.

Bei sehr trockener Haut soll Cliniderm Lösung nicht über längere Zeit angewendet werden.

Schwangerschaft/Stillzeit

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt.

Unerwünschte Wirkungen

Überempfindlichkeitsreaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sind möglich.

Zulassungsnummer

43165 (Swissmedic).

Zulassungsinhaberin

Dr. Wild & Co. AG, 4002 Basel.

Stand der Information

Dezember 2004.

Für dieses Präparat existiert keine behördlich genehmigte Fachinformation. Der Text ist eine von der Documed erstellte Kurzfassung (Pseudo-Fachinformation) der behördlich genehmigten Patienteninformation. Dieser Text wurde vom verantwortlichen Unternehmen zur Publikation durch die Documed AG freigegeben. © Copyright 2008 by Documed AG, Basel. Die unberechtigte Nutzung und Weitergabe ist untersagt. [10.10.2007]